

◇定期予防接種の種類

〔R8年4月現在〕

種類	対象者	標準的な接種の方法と回数
ロ タ	※接種ワクチンにより対象年齢が異なります 〔ロタリックス〕 生後6週0日～出生 24 週0日 〔ロタテック〕 生後6週0日～出生 32 週0日 *1回目標準的接種期間:生後2か月～生後 14 週6日後までに接種	※接種ワクチンにより、回数が異なります 〔ロタリックス〕 27 日以上の間隔をおいて2回経口接種 〔ロタテック〕 27 日以上の間隔をおいて3回経口接種
小児用 肺炎球菌	生後2か月～5歳未満	※接種開始年齢により、回数と間隔が異なります 〔生後2か月から7か月未満〕 初回:27 日以上の間隔で3回接種 追加:3回目の接種後 60 日以上の間隔で1回接種(1歳以上) 〔生後7か月から 12 か月未満〕 初回:27 日以上の間隔で2回接種 追加:2回目の接種後 60 日以上の間隔で1回接種(1歳以上) 〔生後1歳から2歳未満〕 60 日以上の間隔で2回接種 〔生後2歳から5歳未満〕 1回接種
B型肝炎	生後1歳に至るまで (1歳の誕生日の前日まで)	27 日以上の間隔をあけて、2回接種し、第1回目の接種から 139 日以上の間隔をおいて、接種【計3回】
5種混合 (ジフテリア・ 百日せき・ 破傷風・ 不活化ポリオ・ ヒブ)	生後2か月から7歳半 まで	1期初回:20～56 日までの間隔で3回接種 1期追加:初回3回目の接種終了後6～18 か月に達する間に1回接種
BCG	生後1歳未満 *標準的接種期間:生 後5～8か月	1回接種

種類	対象者	標準的な接種の方法と回数
麻しん 風しん (MR)	1期:1歳から2歳未満 2期:年長児	1期:1回接種 2期:1回接種
水 痘	生後1歳から3歳未満	2回接種 1回目を接種し、6か月から 12 か月の間隔をおいて2回目を接種
日本脳炎	1期:3歳から7歳半まで 2期:9歳から 13 才まで (小学校4年生)	1期初回:6～28 日までの間隔をおいて2回接種 1期追加:初回終了後おおむね1年後に1回接種 2期:1回接種
ヒ ブ	生後2か月～5歳未満	※接種開始年齢により、回数と間隔が異なります 〔生後2か月から7か月未満〕 初回:27 日から 56 日までの間隔で3回接種 追加:3回目の接種後7～13 月の間隔で1回接種 〔生後7か月から 12 か月未満〕 初回:27 日から 56 日までの間隔で2回接種 追加:2回目の接種後7～13 月の間隔で1回接種 〔生後1歳から5歳未満〕 1回接種
2種混合 (ジ*テリア破傷風)	小学校6年生	2期:1回接種
子宮頸がん	中学1年生から高校1年生相当の女性	3回接種 〔シルガード9〕 2回目:1回目の接種2月後 3回目:1回目の接種から6月後 ※15 歳未満の女性は <u>6か月以上の間隔を置いて2回接種で完了することができます</u>

※予防接種の種類、接種方法は変更になることがあります。広報、ホームページ等でご確認ください。

問い合わせ:東浦町保健センター
TEL 0562-83-9677