

## ◇定期予防接種の種類

〔R6年4月現在〕

種類	対象者	標準的な接種の方法と回数
ロタ	<p>※接種ワクチンにより対象年齢が異なります</p> <p>〔ロタリックス〕 生後6週0日～出生24週0日</p> <p>〔ロタテック〕 生後6週0日～出生32週0日</p> <p>*1回目標準的接種期間:生後2か月～生後14週6日後までに接種</p>	<p>※接種ワクチンにより、回数が異なります</p> <p>〔ロタリックス〕 27日以上の間隔をおいて2回経口接種</p> <p>〔ロタテック〕 27日以上の間隔をおいて3回経口接種</p>
小児用肺炎球菌	生後2か月～5歳未満	<p>※接種開始年齢により、回数と間隔が異なります</p> <p>〔生後2か月から7か月未満〕 初回:27日以上の間隔で3回接種 追加:3回目の接種後60日以上の間隔で1回接種(1歳以上)</p> <p>〔生後7か月から12か月未満〕 初回:27日以上の間隔で2回接種 追加:2回目の接種後60日以上の間隔で1回接種(1歳以上)</p> <p>〔生後1歳から2歳未満〕 60日以上の間隔で2回接種</p> <p>〔生後2歳から5歳未満〕 1回接種</p>
B型肝炎	生後1歳に至るまで (1歳の誕生日の前日まで)	27日以上の間隔をあけて、2回接種し、第1回目の接種から139日以上の間隔をおいて、接種【計3回】
5種混合 (ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ・ヒブ)	生後2か月から7才半まで	<p>1期初回:20～56日までの間隔で3回接種</p> <p>1期追加:初回3回目の接種終了後12～18か月に達する間に1回接種</p> <p><u>* 令和6年度より定期接種化</u></p> <p>※4種混合ワクチンとヒブワクチンで接種を開始している方は、原則同一のワクチンで接種をすることとされています。</p>
BCG	生後1歳未満 *標準的接種期間:生後5～8か月	1回接種
麻しん 風しん (MR)	1期:1歳から2歳未満 2期:年長児	1期:1回接種 2期:1回接種

水痘	生後1歳から3歳未満	2回接種 1回目を接種し、6か月から12か月の間隔をおいて2回目を接種
日本脳炎	1期:3歳から7歳半まで 2期:9歳から13才まで (小学校4年生)	1期初回:6~28日までの間隔をおいて2回接種 1期追加:初回終了後おおむね1年後に1回接種 2期:1回接種
4種混合 (ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ)	生後2か月から7才半まで	1期初回:20~56日までの間隔で3回接種 1期追加:初回3回目の接種終了後12~18か月に達する間に1回接種  ※4種混合ワクチンとヒブワクチンで接種を開始している方は、原則同一のワクチンで接種をすることとされていますので5種混合ワクチンでの接種はできません。
ヒブ	生後2か月~5歳未満	※接種開始年齢により、回数と間隔が異なります  【生後2か月から7か月未満】 初回:27日から56日までの間隔で3回接種 追加:3回目の接種後7~13月の間隔で1回接種  【生後7か月から12か月未満】 初回:27日から56日までの間隔で2回接種 追加:2回目の接種後7~13月の間隔で1回接種  【生後1歳から5歳未満】 1回接種  ※4種混合ワクチンとヒブワクチンで接種を開始している方は、原則同一のワクチンで接種をすることとされていますので5種混合ワクチンでの接種はできません。
2種混合 (ジフテリア破傷風)	小学校6年生	2期:1回接種
子宮頸がん	中学1年生から高校1年生相当の女性	3回接種 【サーバリックス】 2回目:1回目の接種1月後 3回目:1回目の接種から6月後 【ガーダシル】 2回目:1回目の接種2月後 3回目:1回目の接種から6月後 【シルガード9】 2回目:1回目の接種2月後 3回目:1回目の接種から6月後 ※9歳以上15歳未満の女性は 6か月以上の間隔を置いて2回接種で完了することができます

※予防接種の種類、接種方法は変更になることがあります。広報、ホームページ等でご確認ください。

問い合わせ:東浦町保健センター TEL0562-83-9677